

Bluetongue

Får

Får - kliniske symptomer kan omfatte

- Gispende åndenød
- Væskeansamlinger i hovedet
- Høj feber
- Nedstemthed
- Sår dannelse på slimhinderne i mundhulen (især på tandpladen)
- Cyanotisk tunge (blåfarvning)
- Halvhed som følge af kronrandsbetændelse
- Udbredte muskelnekroser
- Torticollis
- Øjenbetændelse
- Hårtab

Dødeligheden hos får varierer meget (der er rapporteret dødeligheder mellem 5 og 65 % i det hollandske udbrud).

Bluetongue smitter med mitter, du kan følge mitteovervågningen her www.myggetal.dk

Drægtige får og kvæg

Får og køer, der bliver smittet, mens de er drægtige, kan abortere eller føde deforme lam eller kalve. Der er også risiko for, at virus overføres fra ko til kalv under drægtigheden, så kalven bliver født som levedygtig smittebærer. Derfor er det vigtigt, at efterbyrden bliver bortskaffet efter gældende regler, da efterbyrden også kan indeholde virus. Smitte fra mor til afkom under drægtigheden er på nuværende tidspunkt ikke påvist hos får og geder.

Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke

Bluetongue er en liste 1 anmeldepligtig sygdom. Og får du mistanke om udbrud af Bluetongue i din besætning, skal du straks kontakte din besætningsdyrlæge.

Der er desværre pt. ingen forsikringsdækning ved en ramt besætning. Så lige nu er den bedste strategi, at beskytte dyrene imod insektbid.



Så er
Bluetongue virus
kommet til Danmark.
Læs her hvad du
skal være
opmærksom på.

